



Προς : Αθηναϊκό  
Πρακτορείο Ειδήσεων  
[sales@ana-mpa.gr](mailto:sales@ana-mpa.gr)  
[ads@ana-mpa.gr](mailto:ads@ana-mpa.gr)

Αθήνα, 21 Μαΐου 2021  
Αρ.πρωτ.35

**Πρόεδρος**  
Δ. ΛΟΥΤΡΑΔΗΣ  
Καθηγητής Παν. Αθηνών

**Αντιπρόεδρος**  
Α. ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ  
Καθηγητής Παν. Αθηνών

**Γεν. Γραμματέας**  
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  
Διδάκτωρ Παν. Αθηνών

**Ειδικ. Γραμματέας**  
Ε. ΔΕΛΗΓΕΩΡΟΓΛΟΥ  
Καθηγητής Παν. Αθηνών

**Ταμίας**  
Ν. ΒΛΑΧΟΣ  
Καθηγητής Παν. Αθηνών

**Μέλη**  
Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  
Καθηγητής Παν. Θεσ/κης

Γ. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ  
Καθηγητής Παν. Πατρών

Ε. ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ  
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος

Α. ΜΟΡΤΑΚΗΣ  
Διδάκτωρ Παν. Αθηνών

### Δελτίο Τύπου

#### **Θέμα: «Εμβολιασμός για τις γυναίκες Αναπαραγωγικής Ηλικίας»**

- Η κύηση θεωρείται παράγοντας Υψηλού Κινδύνου νόσησης από SARS-CoV-2:
- Η ΕΜΓΕ συνιστά τον εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2 όλων των εγκύων γυναικών και ειδικά αυτών με αυξημένο κίνδυνο έκθεσης (όπως ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, κ.α.)
- Η ΕΜΓΕ συνιστά τον εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2 των εγκύων γυναικών με συννοσηρότητες που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης και θανάτου σε περίπτωση λοίμωξης (όπως διαβήτη, καρδιολογικών και αναπνευστικών νοσημάτων και παχυσαρκίας κλπ. )
- Ο εμβολιασμός συστήνεται κατά την διάρκεια της κύησης σε όλα τα τρίμηνα.
- Αναφορικά με την επιλογή εμβολιαστικού σκευάσματος προτείνεται η χρήση εμβολίων τεχνολογίας mRNA για την κύηση, καθώς τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα αφορούν κυρίως αυτή την κατηγορία εμβολίων έναντι του SARS-CoV-2 χωρίς όμως να αποκλείονται και οι άλλοι τύποι εμβολίων.

- Η χρήση εμβολίων με αδρανοποιημένους ιούς έναντι SARS-CoV-2 δεν αναμένεται να έχει ανεπιθύμητες ενέργειες στην κύηση παρά την έλλειψη σχετικών δεδομένων
- Δεν απαγορεύεται ο εμβολιασμός, με οποιαδήποτε τύπο εμβολίου των γυναικών που θηλάζουν. Ο θηλασμός δεν αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό της μητέρας έναντι COVID-19 και ενδέχεται να προσφέρει παθητική ανοσοποίηση στο νεογνό.
- Η ΕΜΓΕ συνιστά τον εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2 με οποιαδήποτε τύπο εμβολίου, όλων των γυναικών που είναι σε προσπάθεια εγκυμοσύνης στο άμεσο μέλλον, η βρίσκονται σε διαδικασίες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
- Δεν συστήνεται τροποποίηση του προγραμματισμού εγκυμοσύνης με βάση τη χορήγηση οποιουδήποτε από τα εμβόλια έναντι COVID-19, δεν προτείνεται τροποποίηση του εμβολιαστικού σχήματος εάν μεταξύ των δόσεων του εμβολίου η δέκτης ανακαλύψει ότι είναι έγκυος και τέλος δεν συστήνεται διακοπή κύησης λόγω εμβολιασμού.
- Συστήνεται η ύπαρξη μεσοδιαστήματος 14 ημερών μεταξύ του εμβολιασμού έναντι Covid-19 και των άλλων εμβολίων που πρέπει να χορηγούνται κατά την κύηση με βάση την Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΜΓΕ Νο 32 Ανοσοποίηση Στην Κύηση εκτός αν ο άμεσος εμβολιασμός είναι απολύτως αναγκαίος (πχ εμβολιασμός έναντι τετάνου μετά από τραύμα)

<https://hsog.gr/wp-content/uploads/2021/05/Vaccine.pdf>

Με εκτίμηση,  
Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΜΓΕ

Ο Γεν Γραμματέας



Δρ. Π.Πετρόπουλος



Ο Πρόεδρος



Καθηγητής Δ.Λουτράδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

---

Μέλος της FIGO & του EBCOG

ΑΛΚΑΙΟΥ 10 • ΑΘΗΝΑ 11528 • ΤΗΛ:2107774607 & FAX: 2107774609

---

e-mail:helobgyn@otenet.gr • www.hsog.gr